

JATINDER S. SEKHON, M.D.
SUSAN H. BARTON, M.D.
10110 Molecular Drive., #109, Rockville, MD 20850
(301) 417-9528

Nombre del Paciente:

Advanced Surgery Center, LLC
Hospital
10110 Molecular drive
Center
Suite 100
Rockville, MD 20850
(301) 838-0437

Shady Grove Adventist
Out-Patient Surgery
9901 Medical Center Drive
Rockville, MD 20850
240-826-6000

Cita :

Mobiprep

Le pedimos que por favor haga todo lo posible por no faltar ni cancelar su cita. Es muy dificil para nosotros cambiar citas para endoscopias/colonoscopia porque estas requieren la coordinacion de multiples horarios y casi siempre hacer de nuevo la pre-autorizacion con su seguransa. Si usted desea cambiar su cita o cancelar es su responsabilidad de llamar a nuestra oficina por lo menos 48 horas antes de su cita o usted sera responsable al pagar el cargo de \$100.00 por cancelacion. Porfavor asegurarse de que alguien la lleve a su casa despues del prodecimiento debido a que estara sedada y por resto del dia debe descansar.

- Parar el uso de Coumodina (3) dias antes del prodecimiento**
- Suspender el uso de Aspirina, Advil, Motrin, Ibuprofen (7) dias antes del prodecimiento.**
- Parar Plavix (4) dias antes del prodecimiento.**

El dia antes del prodecimiento

- 1. No tomar cualquier diureticos el día antes o el día del prodecimiento.**
 - 2. No debe comer solidos despues de las 8:00 de la mañana.**
 - 3. Comenzar una dieta de liquidos claros. (Liquidos claros so aquellos que usted puede ver atraves)Puede comer gelatina que no sea Roja solo claro.**
 - 4. Usted deber de tomar su medicamento para la pression (3) horas antes del prodecimiento. O como sea indicado por su doctor.**
 - 5. Si usted toma medicamento para la diabetes porfavor tomar la noche antes del prodecimiento**
 - 6. Si usted es asmatico porfavor traer con usted su albuterol.**
 - 7. En el día del prodecimiento evitar el uso de perfumenes o otras aromas.**
- **Si su prodecimiento es alas 11 de la mañana tomar el segundo dosis (4-5) horas antes del prodecimiento.**
 - **Si usted tiene nausea cuando comienze a tomar el medicamento pare de tomárselo por una hora y comenzar nuevamente cuando ya no sienta nausea.**

Cualquier pregunta llamar a la oficina 301-417-9528

Instrucciones para el paciente


La caja de MoviPrep contiene 4 bolsas y un recipiente desechable para mezclar el producto. Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.

Inicio a las: *Primer dosis a las 6pm*

PASO 1


- Vacíe una bolsa A y una bolsa B en el recipiente desechable.
- Agregue agua potable tibia hasta la línea superior del recipiente. Mezcle hasta disolver.

Si lo prefiere, prepare la solución por anticipado y refrigérela antes de beber. La solución reconstituida debe ser utilizada dentro de las 24 horas posteriores a la preparación.



PASO 2

- El recipiente de MoviPrep tiene 4 marcas divisorias. Cada 15 minutos, beba la solución hasta la marca siguiente (aproximadamente 8 oz), hasta completar todo el litro.
- Beba 16 oz del líquido claro de su preferencia.



Inicio a las: *Segunda dosis a las 9:30pm*

- Repita los pasos 1 y 2.

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestro consultorio al _____.

MoviPrep está indicado para la limpieza del colon, como preparación para la colonoscopia en adultos de 18 años o mayores. MoviPrep está contraindicado en pacientes que han presentado una reacción grave de hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. MoviPrep deberá ser utilizado con precaución en pacientes a los que se administran medicamentos concomitantes que aumenten el riesgo de anomalías electrolíticas, en pacientes con hiponatremia conocida o presunta, colitis ulcerosa grave, íleo, obstrucción o perforación gastrointestinal, retención gástrica, colitis tóxica, megacolon tóxico o deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. En ensayos clínicos, las reacciones adversas más frecuentes observadas con la administración de MoviPrep fueron distensión abdominal, molestia anal, sed, náuseas y dolor abdominal.

MoviPrep contiene un máximo de 2.33 mg de fenilalanina por tratamiento.

Lea todo el prospecto adjunto para MoviPrep.



Sitio web: www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 Tel. • 866.669.SLXP (7597)
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE. UU. MOV 06/04

MoviPrep
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.