

**JATINDER S. SEKHON, M.D.**

**SUSAN H. BARTON, M.D.**

10110 Molecular Drive., #109, Rockville, MD 20850

(301) 417-9528

Nombre del Paciente: \_\_\_\_\_

**Advanced Surgery Center, LLC**  
10110 Molecular drive  
Suite 100  
Rockville, MD 20850  
(301) 838-0437

**Shady Grove Adventist Hospital**  
Out-Patient Surgery Center  
9901 Medical Center Drive  
Rockville, MD 20850  
240-826-6000

Porfavor llegar a las: \_\_\_\_\_  
Hora Fecha

## **PREPARACION PARA COLONOSCOPIA**

(NuLytely or GoLytely)

**Le pedimos que por favor haga todo lo posible por no faltar ni cancelar su cita. Es muy dificil para nosotros cambiar citas para endoscopias/colonoscopia porque estas requieren la coordinacion de multiples horarios y casi siempre hacer de nuevo la pre-autorizacion con su seguransa. Si usted desea cambiar su cita o cancelar es su responsabilidad de llamar a nuestra oficina por lo menos 48 horas antes de su cita o usted sera responsable al pagar el cargo de \$100.00 por cancelacion. Porfavor asegurarse de que alguien la lleve a su casa despues del prodecimiento debido a que estara sedada y por resto del dia debe descansar.**

- Parar el uso de Coumodina (3) dias antes del prodecimiento**
- Suspender el uso de Aspirina, Advil, Motrin, Ibuprofen (7) dias antes del prodecimiento.**
- Parar Plavix (4) dias antes del prodecimiento.**

**Usted recibera la receta de la medecina que obtiene (1) gallon de Colyte/Golytely/Trilyte/Nulytely**

### **El dia antes del prodecimiento**

- 1. No tomar cualquier diureticos el dia antes o el dia del prodecimiento.**
  - 2. No debe comer solidos despues de las 8:00 de la manana.**
  - 3. Comenzar una dieta de liquidos claros.**
- (Liquidos claros so aquellos que usted puede ver a traves )**

**Puede comer gelatina que no sea Roja solo claro.**

**Mixtiar la Medecina como indicada en la manana el dia antes del prodecimiento. Mantener el medicamento Nulytelyo Golytely helado. A las 4:00pm comenzar a beber 8 onzas de el medicamento preparado. Tomar los 4 litros del medicamento mixtiado. Esto debe ser terminado a la media noche. Es mejor tomar de una sola vez las 8 onzas del medicamento preparado. Tomar agua o ginger ale entre los vazos del medicamento.**

**6. Despues de beber los 4 litros , usted puede beber liquidos claros hasta la media noche.**

### **El dia del prodecimiento**

**1. Nada puede ser consumido hasta despues del Prodecimiento.**

**( Si el prodecimiento es para las 2:00pm o mas tarde usted puede beber liquidos claros hasta las 9:00 de la manana.)**

**2. Usted deber de tomar su medicamento para la pression (3) horas antes del prodecimiento. O como sea indicado por su doctor.**

**3. Si usted toma medicamento para la diabetes porfavor tomar la noche antes del prodecimiento.**

**4. Si usted es asmatico porfavor traer con usted su albuterol.**

**5. En el dia del prodecimiento evitar el uso de perfumenes o otras aromas.**