

JATINDER S. SEKHON, M.D.

SUSAN H. BARTON, M.D.

10110 Molecular Drive., #109, Rockville, MD 20850
(301) 417-9528

Nombre del Paciente:

Advanced Surgery Center, LLC
10110 Molecular drive
Suite 100
Rockville, MD 20850
(301) 838-0437

Shady Grove Adventist Hospital
Out-Patient Surgery Center
9901 Medical Center Drive
Rockville, MD 20850
240-826-6000

Porfavor llegar a las:

Hora

Fecha

PREPARACION PARA COLONOSCOPIA

(Prepopik)

Le pedimos que por favor haga todo lo posible por no faltar ni cancelar su cita. Es muy dificil para nosotros cambiar citas para endoscopias/colonoscopia porque estas requieren la coordinacion de multiples horarios y casi siempre hacer de nuevo la pre-autorizacion con su seguransa. Si usted desea cambiar su cita o cancelar es su responsabilidad de llamar a nuestra oficina por lo menos 48 horas antes de su cita o usted sera responsable al pagar el cargo de \$100.00 por cancelacion. Porfavor asegurarse de que alguien la lleve a su casa despues del prodecimiento debido a que estara sedada y por resto del dia debe descansar.

- ☑ **Parar el uso de Coumodina (3) dias antes del prodecimiento**
- ☑ **Suspender el uso de Aspirina, Advil, Motrin, Ibuprofen (7) dias antes del prodecimiento.**
- ☑ **Parar Plavix (4) dias antes del prodecimiento.**

1. Usted recibera una receta que obtiene la prepa de Prepopik de su farmacia local.
2. comprar 3 tabletas de bisacodyl (cada tablet es de 5 mg) las cuales son sin receta.

El dia antes del prodecimiento

- 1. No tomar cualquier diureticos el dia antes o el dia del prodecimiento.**
- 2. No debe comer solidos depues de las 8:00 de la manana.**
- 3. Comenzar una dieta de liquidos claros.**
(Líquidos claros so aquellos que usted puede ver atraves)
- 4. Comenzar su primer dosis entre las 4:00pm y 6:00pm de la tarde antes del examen. Tomar las 3 tabletas de bisacodyl.**
- 5. Mixtiar un paquete de prepopik con agua helada hasta lluegar ala linea marcada en el vaso incluido.**
- 6. Entre las 7:00 pm y 8:00 pm comenzar a tomar la solucion completa de Prepopik (no mas antes de las 2 horas despues de tomarse las 3 tabletas de Bisacodyl)**
- 7. Tomar Ginger Ale para reducir nausea.**
- 8. Comenzar la segunda dosis por lo menos (4) horas antes del examen. Mixtiar el Segundo paquete de prepopik con agua helada hasta lluegar ala linea marcada en el vaso. Usted debe de terminar todo el medicamento completo.**
- 9. Despues debe tomarse por lo menos 8 onzas de agua o de cualquier otro luiquido claro.**
- 10. Usted tiene que terminar por lo menos (3) horas antes de su examen. Si usted bebe o come aunque sea un poquito su examen sera cancelado.**

*** El inicio de ir al bano comenzara despues de 1 hora de que se tome el primer vaso del medicamento. Continuara por otras horas mas despues de que se tome el ultimo vaso. A ese momento su escremento tiene que ser liquido y claro.**

El dia del prodecimiento

- 1. Nada puede ser consumido hasta despues del Prodecimiento.**
(Si el prodecimiento es para las 2:00pm o mas tarde usted puede beber liquidos claros hasta las 9:00 de la manana.)
- 2. Usted debe de tomar su medicamento para la pression (3) horas antes del prodecimiento. O como sea indicado por su doctor.**
- 3. Si usted toma medicamento para la diabetes porfavor no la tome la noche antes del prodecimiento ni el dia del prodecimiento.**
- 4. Si usted es asmatico porfavor traer con usted su albuterol.**
- 5. En el dia del prodecimiento evitar el uso de perfumenes o otras aromas.**

*** Si tiene un problema o preguntas , llame a nuestras oficina al 301-417-9528**