

JATINDER S. SEKHON, M.D.

SUSAN H. BARTON, M.D.

10110 Molecular Drive., #109, Rockville, MD 20850
(301) 417-9528

Nombre del Paciente:

Advanced Surgery Center, LLC
10110 Molecular drive
Suite 100
Rockville, MD 20850
(301) 838-0437

Shady Grove Adventist Hospital
Out-Patient Surgery Center
9901 Medical Center Drive
Rockville, MD 20850
240-826-6000

Cita :

PREPARACION PARA COLONOSCOPIA

(Suprep)

Le pedimos que por favor haga todo lo posible por no faltar ni cancelar su cita. Es muy dificil para nosotros cambiar citas para endoscopias/colonoscopia porque estas requieren la coordinacion de multiples horarios y casi siempre hacer de nuevo la pre-autorizacion con su seguransa. Si usted desea cambiar su cita o cancelar es su responsabilidad de llamar a nuestra oficina por lo menos 48 horas antes de su cita o usted sera responsable al pagar el cargo de \$100.00 por cancelacion. Porfavor asegurarse de que alguien la lleve a su casa despues del prodecimiento debido a que estara sedada y por resto del dia debe descansar.

- Parar el uso de Coumodina (3) dias antes del prodecimiento**
- Suspender el uso de Aspirina, Advil, Motrin, Ibuprofen (7) dias antes del prodecimiento.**
- Parar Plavix (4) dias antes del prodecimiento.**

Usted recibera una receta que obtiene la preparacion de Suprep de su farmacia local.

El dia antes del prodecimiento

- 1. No tomar cualquier diureticos el dia antes o el dia del prodecimiento.**
- 2. No debe comer solidos depues de las 8:00 de la manana.**
- 3. Comenzar una dieta de liquidos claros.**
(Líquidos claros so aquellos que usted puede ver atraves)
- 4. Comenzar la primera dosis alas 7:00pm la noche antes de su examen.**
- 5. Mixtiar un bote de 6-onzas de suprep, agregar agua helada a la línea del bote de 16 onzas.**
- 6. Tomar todo el liquido en el bote.**
- 7. Usted debe de tomarse (2) mas botes de 16 onzas de agua por la próxima hora.**
- 8. Comenzar el segundo dosis 5 horas antes de su prodecimiento.**
Repita pasos 5 al 7.

9. Usted tiene que terminar por lo menos (3) horas antes de su examen. Si usted bebe o come aunque sea un poquito su examen sera cancelado.

*** El inicio de ir al bano comenzara despues de 1 hora de que se tome el primer vaso del medicamento. Continuara por otras horas mas despues de que se tome el ultimo vaso. A ese momento su escremento tiene que ser liquido y claro.**

El dia del prodecimiento

- 1. Nada puede ser consumido hasta despues del Prodecimiento.**
(Si el prodecimiento es para las 2:00pm o mas tarde usted puede beber liquidos claros hasta las 9:00 de la manana.)
- 2. Usted debe de tomar su medicamento para la pression (3) horas antes del prodecimiento. O como sea indicado por su doctor.**
- 3. Si usted toma medicamento para la diabetes porfavor no la tome la noche antes del prodecimiento ni el dia del prodecimiento. Al solo que el Doctor le diga.**
- 4. Si usted es asmatico porfavor traer con usted su albuterol.**
- 5. En el dia del prodecimiento evitar el uso de perfumenes o otras aromas.**

*** Si tiene un problema o preguntas , llame a nuestras oficina al 301-417-9528**